

認識失智症 及治療



中度失智症狀

- 忘記最近發生的事情，或人的名字
- 無法煮飯、清潔或購物
- 需要他人協助維持個人衛生
(洗澡、上廁所或更衣)



重度失智症狀

- 吃飯/吞嚥困難
- 步行困難
- 小便或大便失禁



失智症醫療的選擇

- 目前無法根治失智症，但治療可延緩病情的惡化。
- 其他治療包括精神和心理支持，如運動療法、音樂和藝術輔療，以及照光治療。



目前兩類治療失智症藥物

1. 乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 抑制劑：
 - Donepezil (愛憶欣)
 - Rivastigmine (憶思能)
2. 麩氨酸 (NMDA受體) 抑制劑：
 - Memantine (威智)



敬祝您

身體健康 平安吉祥

諮詢方式

返家後若有失智症相關問題，
請來電諮詢

諮詢電話：05-2648000 _____ 分機

佛教慈濟醫療財團法人

各院區健康諮詢專線

花蓮慈濟醫院：(03) 8562016

玉里慈濟醫院：(03) 8882718 分機 9

關山慈濟醫院：(089) 8148000 分機 128

台北慈濟醫院：(02) 66289779 分機 2236

台中慈濟醫院：(04) 25368069

大林慈濟醫院：(05) 2648333

斗六慈濟醫院：(05) 5372000 分機 127

網址：<http://www.tzuchi.com.tw>

大林慈院 112.02 制訂



**失智症：
記憶力退化是警訊**

失智症與正常老化的區別

失智症常見於老年人，但不是正常老化的一部份。隨著年齡增長，人的思考可能變慢，但嚴重影響人際關係和日常活動的退化，不是典型老化的一部份。

失智症	正常老化
判斷力和決定力不佳	偶爾做出糟糕的決定
沒有管理預算的能力	忘記去繳每月的帳單
搞不清楚年月日等時間	忘記今天的日期，但之後又想起
進行對話有困難	有時忘記要使用那些字詞
放錯東西的位置，但卻想不起而無法找到它們	偶爾丟東丟西

症狀

重複

可能一再重複相同的事或說相同的話。

昨天晚上，我做了一個夢……

他已經跟我說過很多次這個夢



憂鬱

會有40%發生嚴重憂鬱，進而影響生活品質。



混淆

- 不記得熟悉的人。
- 地點或事物。
- 難以回想起最近發生的事件，或搞不清楚現在身在何處。

我澆過水了嗎？



攻擊性

身體或言語上的憤怒和攻擊性。



咦，我家在哪裡？

遊走

60%發生遊走的問題嚴重會導致迷路。



分類

輕度失智症狀

- 言語表達困難
- 變得明顯健忘
- 不清楚今天是幾月幾號

今天是幾月幾號？

