

包皮環切手術(割包皮)說明書

病歷號：_____

姓名：_____

生日：民國_____

床號：_____

請您詳細閱讀：

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

手術目的與步驟：

目的：包皮環切手術(割包皮)是為了解決包莖(包皮過長)、嵌性包莖(包皮過長且狹窄處嵌住陰莖影響血液回流)、慢性包皮龜頭炎等問題，而須做的手術治療。若僅是為了美觀考量，則術前應慎重考慮。

步驟：手術時先剝開包皮露出龜頭後，在冠狀溝下方選擇適當距離切出二道皮膚深度且平行的圓周形傷口，然後把其中過長的包皮與其下的皮下組織分離並予以切除，最後進行止血工作與傷口縫合。

註：成人接受包皮環切手術(割包皮)時，可在局部麻醉下進行；孩童接受包皮環切手術(割包皮)時，則往往須在全身麻醉下進行。

手術效益：

1. 過長的包皮會被切除。
2. 術後對於局部衛生的維持將有所助益。
3. 如有包皮龜頭炎或濕疹的發生，其情況常能得以改善。

手術風險：

1. 包皮環切手術術後可能發生出血、血腫現象(發生率小於 30%)，且多可以壓迫法控制住。
2. 術後一週內局部應避免碰水以減少傷口感染(發生率小於 10%)機會。
3. 可能發生傷口疼痛及傷口腫脹現象。
4. 可能發生傷口不易或延遲癒合。嚴重者可能需要接受清創或植皮手術(發生率小於 1%)。
5. 術後一段時間龜頭可能變得比較敏感。

替代方案：

近年來有人嘗試以局部塗抹類固醇藥膏來治療孩童包莖而得到一定的效果，但須與醫師討論再決定。

手術後之後續治療：

1. 術後 1 至 3 日內應回門診接受換藥治療。
2. 術後如發生嚴重出血、血腫現象，可至門診或急診求診。

檢查前停/用藥指示 (未依指示停/用藥，可能造成無法執行檢查)

1. 若有在服用影響凝血功能之保健食品或中草藥，建議至少停用七天。如：魚油、大蒜精、銀杏、納豆激酶、維生素 E、輔酶 Q10、葡萄糖胺、月見草油、亞麻籽油、人參、丹參、紅花、桃仁、莢朮、川七、沒藥、乳香、薑黃素等。
2. 其他需停用藥品(如:抗凝血、抗血小板藥品...等)，請依照醫師指示，進行停藥準備。

說明醫師：

(簽章) 時間:西元

年

月

日

時

分

本人(或家屬) _____ 已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
包皮環切手術(割包皮)說明書

病歷號：_____

姓名：_____

生日：民國_____

床號：_____

案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

與病人之關係：

其他：

病人(或家屬)：

(簽章) 時間:西元 年 月 日 時 分

見證人(如無見證人得免填載)：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。
見證人部分，如無見證人得免填載