

男性輸精管結紮手術說明書

病歷號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 生日：民國\_\_\_\_\_ 床號：\_\_\_\_\_

**請您詳細閱讀：**

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

**手術目的與步驟：**

目的：為了避孕的目的，將雙側輸精管結紮，達到永久避孕的目的。

步驟：手術一般採用局部麻醉，於雙側陰囊分別切開小傷口，將雙側輸精管結紮，手術後不致於影響勃起與射精功能。

**手術風險：**

一般而言，此種手術安全性與成功率高；但是沒有任何手術，是完全沒有風險的。以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出：

- 1.術後可能會發生局部血腫（2%）及傷口感染（3.4%）。
- 2.可能併發副睪炎（<1%）。
- 3.有約小於 0.5%之手術失敗率，肇因於輸精管結紮後，少數病例其已結紮之輸精管會早期自通或極少之三條輸精管病例，因此最好是術後三個月後進行精液分析確定無精蟲後才算手術成功。
- 4.有些醫師會將切下之輸精管送病理檢查，因為部分病人會因局部因素造成輸精管結紮失敗。
- 5.結紮處形成小硬塊，是肉芽組織結疤形成的，屬於正常現象。
- 6.結紮處也可形成精液囊腫（<1%）

**替代方案：**

1. 男性使用保險套。
2. 女性使用子宮內避孕器、服用避孕藥與接受輸卵管結紮手術等等。

**手術後注意事項：**

1. 術後一週內請勿泡澡。
2. 術後一週後，請至泌尿科門診檢視傷口與確定輸精管結紮成功。
3. 術後射精 15 至 20 次後，請遵照醫囑回門診追蹤檢查精液，以確定精液無精蟲，在此前仍請做好避孕之準備，以確保安全。
4. 術後傷口會有些許疼痛不適，可給予局部冰敷及口服藥物後會逐漸改善。
5. 若有陰囊明顯腫脹、疼痛難耐及發燒等症狀，請立刻至本院門診或急診就診。

**檢查前停/用藥指示（未依指示停/用藥，可能造成無法執行檢查）**

1. 若有在服用影響凝血功能之保健食品或中草藥，建議至少停用七天。如：魚油、大蒜精、銀杏、納豆激酶、維生素 E、輔酶 Q10、葡萄糖胺、月見草油、亞麻籽油、人參、丹參、紅花、桃仁、莢朮、川七、沒藥、乳香、薑黃素等。
2. 其他需停用藥品(如:抗凝血、抗血小板藥品...等)，請依照醫師指示，進行停藥準備。

說明醫師：\_\_\_\_\_ (簽章) 時間:西元 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分

本人(或家屬) \_\_\_\_\_ 已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

男性輸精管結紮手術說明書

病歷號：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

生日：民國\_\_\_\_\_

床號：\_\_\_\_\_

與病人之關係：

其他：

病人(或家屬)：

(簽章) 時間：西元

年

月

日

時

分

見證人(如無見證人得免填載)：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。  
見證人部分，如無見證人得免填載