

前列腺根除手術說明書

病歷號：_____

姓名：_____

生日：民國_____

床號：_____

請您詳細閱讀：

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

手術目的與步驟：

目的：前列腺根除手術是為了治療早期前列腺癌，而需進行的手術。

步驟：手術通常包括骨盆腔淋巴結廓清、前列腺及貯精囊全切除及膀胱尿道重新吻合術。

手術效益：

一般而言接受前列腺根除手術的病患可得長期(>10年)存活，同時術後只需長期追蹤PSA，但仍然大約有1/3的病患，將來可能發生局部復發或遠端轉移，可能需進一步接受輔助放射線治療或荷爾蒙治療。

手術風險：

1. 前列腺根除手術短期可能發生的併發症包括：

- A. 一般出血量為 200-2000CC。
- B. 發燒。
- C. 術後傷口感染，可能造成傷口不易癒合或延遲癒合(<10%)。
- D. 淋巴液或積血引流不順，形成後腹腔內淋巴囊腫或膿瘍(<10%)。
- E. 尿液滲出導致尿液蓄積在後腹腔造成膿瘍(<10%)。
- F. 血尿及膀胱外血腫。
- G. 心肌梗塞、腦中風、靜脈血栓(<1%)。
- H. 因以上各種原因可能導致死亡，但整體死亡率小於 1%。

2. 長期併發症：（以下併發症因年齡、手術方法、體質及疾病嚴重度等原因而有不同發生率）

- A. 尿失禁(約 5-10%)。
- B. 陰莖勃起功能喪失(約 50%)。
- C. 術後尿道或膀胱頸狹窄(<10%)。

替代方案：（若病人因任何原因不適合手術，可能考慮的替代方案為）

各種治療方式各有其風險及併發症，請與醫師詳細討論：

前列腺根除手術說明書

病歷號：_____

姓名：_____

生日：民國_____

床號：_____

1. 放射線治療(即電療)。
2. 荷爾蒙治療。

手術後之後續治療：

一般而言，術後不需再做其他後續治療，若術後有腫瘤再發跡象，可能要做放射線治療或荷爾蒙治療，需與醫師詳細討論。

檢查前停/用藥指示 (未依指示停/用藥，可能造成無法執行檢查)

1. 若有在服用影響凝血功能之保健食品或中草藥，建議至少停用七天。如：魚油、大蒜精、銀杏、納豆激酶、維生素E、輔酶Q10、葡萄糖胺、月見草油、亞麻籽油、人參、丹參、紅花、桃仁、莢朮、川七、沒藥、乳香、薑黃素等。
2. 其他需停用藥品(如:抗凝血、抗血小板藥品...等)，請依照醫師指示，進行停藥準備。

以上各種治療方式，各有適應症及優缺點，如有疑問可與主治醫師討論。

說明醫師：

(簽章) 時間:西元

年

月

日

時

分

本人(或家屬) _____ 已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

與病人之關係：

其他：

病人(或家屬)：

(簽章) 時間:西元

年

月

日

時

分

見證人(如無見證人得免填載)：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

見證人部分，如無見證人得免填載