

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
婦產科一般開腹手術說明書

病歷號：_____ 姓名：_____ 生日：民國_____ 床號：_____

大德，您好！這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

一、患者已瞭解一般開腹手術（子宮、卵巢、輸卵管切除）之必要性。

二、婦產科一般開腹手術之適應症：

- （一）腹腔內腫瘤，需進一步探查之狀況。
- （二）腹腔內積血，需進一步探查以確定明確之出血處。
- （三）腹腔內蓄膿，需進一步探查或引流者。
- （四）腹腔內器官組織之嚴重黏連，需進一步探查並剝離者。

三、婦產科一般開腹手術之併發症：

- （一）術後傷口感染之發生率約為2.3 ~ 6.4%。
- （二）術後傷口癒合不良之發生率約為0.3 ~ 3.0%。
- （三）術後出血及骨盆腔血腫之發生率為2.0%。
- （四）膀胱損傷之發生率為1.8%。
- （五）直腸損傷之發生率為0.4%。
- （六）術後死亡之發生率為0.16%。
- （七）遲發性瘻管形成之發生率約為0.04%。
- （八）傷口處疝氣之發生率約為0.5-1.0%。
- （九）術後腹內黏連。
- （十）其他偶發之病變或併發症。

四、替代方案：如您決定不施行這個手術，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。

檢查前停／用藥指示（未依指示停／用藥，可能造成無法執行檢查）

1. 若有在服用影響凝血功能之保健食品或中草藥，建議至少停用七天。如：魚油、大蒜精、銀杏、納豆激酶、維生素E、輔酶Q10、葡萄糖胺、月見草油、亞麻籽油、人參、丹參、紅花、桃仁、莢朮、川七、沒藥、乳香、薑黃素等
2. 其他需停用藥品(如:抗凝血、抗血小板藥品...等)，請依照醫師指示，進行停藥準備。

說明醫師：_____（簽章） 時間:西元_____年_____月_____日_____時_____分

本人(或家屬) _____已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
婦產科一般開腹手術說明書

病歷號：_____ 姓名：_____ 生日：民國_____ 床號：_____

與病人之關係：

其他：

病人(或家屬)：_____ (簽章) 時間:西元 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 時 _____ 分

見證人(如無見證人得免填載)：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

見證人部分，如無見證人得免填載