

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
子宮鏡、膀胱鏡手術說明書

病歷號：_____ 姓名：_____ 生日：民國_____ 床號：_____

大德，您好！這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

- 一、患者已瞭解子宮鏡或膀胱鏡手術之必要性。
- 二、子宮鏡及膀胱鏡手術乃是經陰道及子宮頸或尿道在電視螢光幕全程監測進行之內視鏡手術，術後腹部無傷口，故疼痛較少，原則上不需住院或僅需住院 1-3 天，而術後一至數天即可恢復正常生活。
- 三、子宮鏡、膀胱鏡手術的特殊事項：手術所需的設備及醫療人員的訓練較複雜；某些手術（如大於 5 公分的子宮黏膜下肌瘤切除，重度子宮腔沾粘剝離手術）時間會較長，子宮鏡手術以液體來擴張子宮腔會造成術後數天之血水樣陰道分泌物；膀胱鏡手術後可能得短期內放置導尿管及膀胱訓練，部份手術所需之特殊器械及手術項目目前健保不給付，需要自費。
- 四、任何手術及麻醉都有潛在的危險，在子宮鏡、膀胱鏡手術中可能發生以下之危險或併發症，因而延長住院時間或必須住院觀察，甚至可能必需進行後續的第二次手術：子宮破裂(1-10%)；水中毒及電解質不平衡(1-4%)；手術中及手術後大出血(0.2-3%)；手術後骨盆腔發炎(0.7-3%)；子宮腔血腫(1-2%)，膀胱炎、膀胱破裂傷及輸尿管。以下是極罕見之病歷報告（故無實際之發生率統計數字），1. 作完子宮鏡手術後懷孕，造成植入性胎盤及子宮破裂；2. 因子宮破裂後造成之腸道泌尿道損傷。

五、緊急措施：

- (一)因水中毒引起的肺水腫、腦水腫，必須住進加護病房。
- (二)子宮破裂或是與手術有關的大出血，可能必需以傳統開腹手術或腹腔鏡手術補救之，甚至可能需將子宮切除。腸道損傷可能會因修補腸道而必須進行腸道造口術。醫學文獻曾報導極少數病人可能因手術併發症而致命。
- (三)膀胱破裂或傷及輸尿管可能得改為腹部手術，或放置導尿管一段時間。

六、手術後注意事項：

病人送出手術室前(Sign Out)，確認術後照護應注意事項，由醫師記錄並與照護團隊成員交班，照護團隊告知病人於手術後有出血情形，陰道可能有填塞紗布以止血，紗布一端可能露出陰道口，以利於術後 1-2 天後由醫護人員協助取出。

七、替代方案：（這個手術(或醫療處置)的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術(或醫療處置)，可能會有危險，請與醫師討論您的決定)

子宮鏡：改用剖腹手術切除

膀胱鏡：經靜脈注射顯影劑泌尿系統攝影(IVU)：可觀察整個泌尿系統；但對於膀胱內較小的腫瘤不易察覺。缺點：注射顯影劑對腎臟功能不好的病人或對顯影劑過敏的病人是禁忌。

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
子宮鏡、膀胱鏡手術說明書

病歷號：_____ 姓名：_____ 生日：民國_____ 床號：_____

檢查前停／用藥指示（未依指示停／用藥，可能造成無法執行檢查）

1. 若有在服用影響凝血功能之保健食品或中草藥，建議至少停用七天。如：魚油、大蒜精、銀杏、納豆激酶、維生素E、輔酶Q10、葡萄糖胺、月見草油、亞麻籽油、人參、丹參、紅花、桃仁、莪朮、川七、沒藥、乳香、薑黃素等
2. 其他需停用藥品(如:抗凝血、抗血小板藥品...等)，請依照醫師指示，進行停藥準備。

說明醫師：_____ (簽章) 時間:西元 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 時 _____ 分

本人(或家屬) _____ 已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

與病人之關係：_____ 其他：_____

病人(或家屬)：_____ (簽章) 時間:西元 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 時 _____ 分

見證人(如無見證人得免填載)：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。
見證人部分，如無見證人得免填載