

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院  
植皮手術說明書

病歷號：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

生日：民國\_\_\_\_\_

床號：\_\_\_\_\_

這份說明書是有關您即將接受的手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術(或醫療處置)的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

**疾病名稱：**

糖尿病足 手術後開放性傷口 急性傷口缺損 慢性潰瘍傷口 燒燙傷 腫瘤術後缺損

其他 \_\_\_\_\_

**手術(或醫療處置)**

1. 淺皮層植皮手術( STSG )：是以取皮電刀或手術刀將皮膚部份皮層取下
2. 全皮層植皮手術 ( FTSG )：是以取皮電刀或手術刀將皮膚全皮層取下
3. 手術目的： 可加速傷口的痊癒，縮短住院時間。

**手術效益與注意事項：**

(經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。)

1. 植皮手術後傷口經醫師專業判斷，無法自行癒合時，需進行之必要手術。
2. 此次植皮手術之取皮處，術後會殘留部分疤痕或色素沈積。
3. 植皮手術後，傷口將以石膏固定之，以防植皮手術失敗。
4. 術後患肢或患處盡量抬高，減少活動，可促進血液循環，提高植皮成功率。
5. 術後患肢若要復建，需在醫師判斷後施行之。
6. 植皮後，傷口外觀會有疤痕或外型之改變，可藉由彈性衣襪，減少腫脹壓平疤痕。
7. 手術前後禁煙(包括二手煙)、禁酒及辛辣刺激之飲食。
8. 供皮區以人工敷料使用，不需經常更換。
9. 上述說明如有疑問，請在立同意書時詢問有關醫師

**手術風險：**

(沒有任何手術(或醫療處置)是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。)

依文獻記載及報告，手術過程之可能發生的併發症及副作用，包括如下：

1. 傷口血腫致植皮失敗。
2. 皮瓣滑動致植皮失敗。
3. 傷口感染傷口疼痛

**一般手術的風險(少於 1%)：**

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院  
植皮手術說明書

病歷號：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

生日：民國\_\_\_\_\_

床號：\_\_\_\_\_

- a、使用全身麻醉的時間較長時，肺臟可能會有一小部分塌陷失去功能，以致增加胸腔感染的機率，此時可能需要抗生素和呼吸治療。
- b、因心臟承受壓力，可能造成心臟病發作，也可能造成中風。
- c、有其他重大內科疾病之患者，如有糖尿病、心肺、肝臟、腎臟、內分泌、腦病變及腫瘤等，均有較高之手術風險。

本手術可能有的合併症如下：

- 1)術後出血。
- 2)受皮區植皮感染,壞死; 供皮區感染傷口癒合不良。

**替代方案：**

(這個手術(或醫療處置)的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術(或醫療處置)，可能會有危險，請與醫師討論您的決定)

這個手術的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術，請與醫師討論您的決定後勾選：

- 不接受植皮手術
- 皮瓣手術
- 其它(\_\_\_\_\_)

**注意事項：**

- 1) 如有接受植皮手術，傷口暫不換藥一般約 2-4 天後才會拆開傷口換藥。
- 2) 禁煙或二手煙。
- 3) 傷口禁壓。
- 4) 儘量臥床休息 2-4 天，減少補皮傷口拉扯。

**醫師補充說明：**

**檢查前停/用藥指示(未依指示停/用藥，可能造成無法執行檢查)**

1. 若有在服用影響凝血功能之保健食品或中草藥，建議至少停用七天。如：魚油、大蒜精、銀杏、納豆激酶、維生素 E、輔酶 Q10、葡萄糖胺、月見草油、亞麻籽油、人參、丹參、紅花、桃仁、菝葜、川七、沒藥、乳香、薑黃素等。
2. 其他需停用藥品(如:抗凝血、抗血小板藥品...等)，請依照醫師指示，進行停藥準備。

說明醫師：

(簽章) 時間:西元 年 月 日 時 分

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院  
植皮手術說明書

病歷號：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

生日：民國\_\_\_\_\_

床號：\_\_\_\_\_

本人(或家屬)已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

與病人之關係：

其他：

病人(或家屬)：

(簽章) 時間:西元 年 月 日 時 分

見證人(如無見證人得免填載)：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

見證人部分，如無見證人得免填載