

主動脈剝離症手術說明書

病歷號：_____

姓名：_____

床號：_____

這份說明書是有關您即將接受的手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術(或醫療處置)有任何疑問，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

手術(或醫療處置)：

一、主動脈剝離症手術適應症：本患者符合下列第_____項。

- (1) 主動脈剝離症：A型，即昇主動脈剝離症，可能包含降主動脈剝離症，伴隨或不伴隨主動脈瓣閉鎖不全。
- (2) 主動脈剝離症：B型，即降主動脈剝離症，主動脈擴大即將破裂、肋膜腔積血、腹腔臟器或下肢缺血、脊髓神經麻痺(下肢麻痺)、或持續疼痛。

- (3) 主動脈已破裂。
- (4) 主動脈即將破裂。

時間	A型	B型
一個月	43%	91%
一年	39%	89%
五年	33%	80%

二、主動脈剝離症(主動脈尚未破裂)之非手術治療存活率：

三、主動脈若已破裂之非手術治療死亡率：接近100%。

手術效益：(經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。)

修補主動脈之破裂處、治療或預防出血。

手術風險：(沒有任何手術(或醫療處置)是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。)

主動脈剝離症手術是一項高難度外科手術，具有相當危險性，部分患者術後可能發生下列併發症：

(1)手術後死亡：

a.手術死亡率係由下列因素決定：

- (A)病患年齡。
- (B)病情嚴重度：主動脈破裂、手術急迫性、主動脈剝離嚴重度、主動脈弓需修補、需作冠狀動脈繞道手術、需作主動脈瓣修補或置換術、心臟衰竭嚴重度。
- (C)伴隨疾病嚴重度：周邊血管狹窄或阻塞嚴重度、腦血管病變(即腦中風)、腎臟功能異常、肝臟功能異常、慢性阻塞性肺病、糖尿病。
- (D)麻醉危險度。

主動脈剝離症手術說明書

病歷號：_____

姓名：_____

床號：_____

b.根據國內外不同文獻報告，主動脈剝離症手術死亡率、手術後長期存活率、及相關後遺症，略述如下：(請注意：本院此項手術死亡率可能略高)

	A型	B型
(a)死亡率	16-31%	24-66%
伴隨主動脈弓需修補	10-42%	
主動脈若已破裂且休克	接近100%	接近100%
(b)死亡原因		
出血或心臟衰竭	大多數	大多數
腦部病變(即腦中風或腦出血) 或低氧性腦病變	10%	10%
多器官衰竭		
其他		
(c)手術後長期存活率	1年66%	
	5年46%	
死亡原因：		
主動脈再剝離或夾層破裂	33%	
冠狀動脈病變		
頭頸動脈病變		
(d)主動脈夾層擴大	10-50%	
(e)主動脈再剝離	8-21%	
(f)再次主動脈瓣手術	8-29%	
(g)再次主動脈手術	10-26%	6-38%

c.由您的病情之危險因子，根據本院資料庫及國內外不同文獻報告，您接受主動脈剝離手術後之死亡率為 _____%(死亡率包括手術中死亡、手術後死亡、及因手術後 併發症而死亡)。

主動脈剝離症手術說明書

病歷號：_____

姓名：_____

床號：_____

(2)手術後併發症：發生率約____%，並可能導致死亡。

A. 手術後出血：可能再次手術止血。

B. 心肌衰竭及低心搏出、急性心肌梗塞、心律不整等：以強心劑治療，可能使用主動脈內氣球幫浦、體外循環人工心肺器、心室輔助器、或心臟移植，死亡率為48%。

C. 腦血管病變(及腦中風或腦出血)或低氧性腦病變：可能有後遺症，半身不遂或成為植物人。

D. 腎臟衰竭、呼吸衰竭、肺炎(可能使用人工呼吸器，作氣管切開術)神經病變、精神異常、消化道病變、肝功能異常或衰竭、胰臟炎、內分泌系統病變。

E. 感染。

F. 其他偶發之病變或與手術無關之疾病。

替代方案：(這個手術<或醫療處置>的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術<或醫療處置>，可能會有危險，請與醫師討論您的決定)。

病患及所有家屬們知道治療本患者有下列方法：

(1)內科療法。

(2)外科療法：及主動脈剝離症手術。

(3)轉院治療。

醫師補充說明：

說明醫師：(簽章) 時間:西元 年 月 日 時 分

本人(或家屬)_____已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

病人(或家屬)：(簽章) 時間:西元 年 月 日 時 分

與病人之關係：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

見證人部分，如無見證人得免填載