

動靜脈瘻管手術說明書

病歷號：_____

姓名：_____

生日：民國_____

床號：_____

這份說明書是有關您即將接受的手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術(或醫療處置)有任何疑問，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

手術(或醫療處置)：

☐ 動靜脈人工瘻管手術 ☐ 自體動靜脈瘻管手術

手術內容：

慢性腎衰竭需長期血液透析時，用手術吻合動脈及靜脈形成瘻管。或使用人工血管以作為洗腎用的血管通路。一般在局部麻醉或全身麻醉下進行。

手術效益：(經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。)

手術成功率(血管暢通率)：

約 85~90%，失敗原因多因血栓形成等。

手術風險：(沒有任何手術(或醫療處置)是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。)

手術併發症：

- (1)感染：在自體血管之動靜脈瘻管發生率約 2~3%，使用人工血管者約 11.35%，必要時需手術移除人工血管。
- (2)動脈竊流症候群(arterial steal syndrome)及末梢缺血症狀：約 2.2%，可能病人本身血管有問題(如糖尿病或粥狀動脈硬化之血管)，或過量的動脈血被引流至瘻管內，造成末梢血量缺血。
- (3)心臟衰竭：瘻管會增加靜脈血回流量，增加心臟的前負荷。必要時需要束帶減少血流甚或關閉瘻管改採其他透析方式(如腹膜透析)。
- (4)血腫：約 2.1%會出血，甚至形成血腫塊。
- (5)其他心血管系統併發症：約 1.2%，包括心肌梗塞等，嚴重時會死亡。
- (6)神經病變：約 2.25%會有不同程度的神經病變。

※慢性腎衰竭為全身性疾病，故除了局部傷口之併發症外，全身性併發症(如中風、心肌梗塞、肺炎等)亦可能發生。

動靜脈瘻管手術說明書

病歷號：_____

姓名：_____

生日：民國_____

床號：_____

替代方案：(這個手術<或醫療處置>的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術<或醫療處置>，可能會有危險，請與醫師討論您的決定)。

可能替代方案：

(1)用植入式導管作為短期或中長期血液透析通路。

(2)腹膜透析。

醫師補充說明：

檢查前停／用藥指示（未依指示停／用藥，可能造成無法執行檢查）

1. 若有在服用影響凝血功能之保健食品或中草藥，建議至少停用七天。如：魚油、大蒜精、銀杏、納豆激酶、維生素E、輔酶Q10、葡萄糖胺、月見草油、亞麻籽油、人參、丹參、紅花、桃仁、莢朮、川七、沒藥、乳香、薑黃素等。

2. 其他需停用藥品(如:抗凝血、抗血小板藥品...等)，請依照醫師指示，進行停藥準備。

說明醫師：(簽章) 時間:西元 年 月 日 時 分

本人(或家屬)已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

與病人之關係：其他：

病人(或家屬)：(簽章) 時間:西元 年 月 日 時 分

見證人(如無見證人得免填載)：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

見證人部分，如無見證人得免填載