

中耳抽水並通氣管置入說明書

病歷號：_____

姓名：_____

生日：民國_____

床號：_____

有關您即將接受的手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術(或醫療處置)有任何疑問，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

一. 擬實施之檢查/治療：

1. 疾病名稱：

2. 建議手術名稱：

3. 建議手術/治療原因：

☐腫瘤☐感染☐出血☐壓迫☐其他_____

4. 執行步驟與過程

(1)到達手術室護理站後，醫護人員會先確認身份與手術部位，再進入手術室

(2)平躺在手術床上

(3)麻醉

☐全身麻醉後消毒鋪單；☐消毒鋪單後局部麻醉，施打麻藥時，會稍微有疼的感覺

(4)進行手術

(5)☐術後至恢復室觀察，穩定後回病房；☐衛教、更衣、批價、回家

5. 手術效益：(經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您一定會獲得任何一項；且手術效益與風險之間的取捨，應由您選擇及決定。)

- 經由中耳抽水與通氣管置入，可以將中耳積水現象緩解。病患因中耳積水造成之耳鳴，耳塞，聽力損失或眩暈，都可立即緩解。

6. 手術風險：(沒有任何手術(或醫療處置)是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些未被認定且為醫師無法預期的風險可能會發生。)

本手術可能之併發症如下：

- 中耳抽水並通氣管置入很安全，如果照顧良好，感染機會很低。術後避免耳朵進水並注意衛生，很少造成感染或出血。小朋友術後應盡量避免激烈運動一個星期，並留心外耳道進水。術後出血的比例約在 0.1-3 %之間。
- 中耳通氣管在病患耳膜上會留存 3-4 個月，極少部分病患會發生通氣管留存時間過久，可能需要另一次局部麻醉手術取出。極少部分小朋友，因為留存時間過久，造成繼發性膽脂瘤。術後仍須定期回診。

7. 合併症發生的機率與嚴重度

發生比例很低。如果發生，醫師會依據併發症發生種類的嚴重程度，採取必要的處置。

如：內科療法、手術治療、復建治療……等。

8. 替代方案：(這個手術(或醫療處置)的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術(或醫療處置)，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。)

中耳抽水並通氣管置入說明書

病歷號：_____

姓名：_____

生日：民國_____

床號：_____

(1)緩和症狀的藥物療法。

(2)復建治療。

9. 醫師補充說明：

- 當鼻咽腔或上呼吸道感染之後，可能會產生耳咽管傷害，造成中耳排水功能障礙。最終形成中耳腔積水。病患會有耳鳴，耳塞，聽力損失或嚴重時造成頭暈現象。
- 手術將在耳膜上形成 1-2 毫米傷口，經由此傷口將中耳腔積水抽乾淨，待通氣良好，在傷口上置入通氣管。通氣管將留存於病患耳膜上 3-4 個月，會自行脫落。

10. 術後注意事項：

- 術前若有服用阿斯匹靈類等抗凝血藥物，請先告訴醫師，並聽從指示於一週前暫停服用。術後不可讓耳朵進水，在通氣管脫落之前不能進行水上活動，如游泳或潛水，以避免感染。盡量不用棉花棒清理外耳道，以免不小心傷害耳膜。

二．醫師之聲明

1. 我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項檢查/治療之相關資訊，特別是下列事項：

☐需實施檢查/治療之原因、步驟與範圍、檢查/治療之風險及成功率、輸血之可能性☐檢查/治療併發症及可能處理方式

☐不實施檢查/治療可能之後果及其他可替代之治療方式

☐預期檢查/治療後，可能出現之暫時或永久症狀

☐如另有檢查/治療相關說明資訊，我已交付病人

2. 我已經給予病人充足時間，詢問下列有關本次檢查/治療的問題，並給予答覆：

(1)_

(2)_

檢查前停／用藥指示（未依指示停／用藥，可能造成無法執行檢查）

1. 若有在服用影響凝血功能之保健食品或中草藥，建議至少停用七天。如：魚油、大蒜精、銀杏、納豆激酶、維生素 E、輔酶 Q10、葡萄糖胺、月見草油、亞麻籽油、人參、丹參、紅花、桃仁、莢朮、川七、沒藥、乳香、薑黃素等。

2. 其他需停用藥品(如:抗凝血、抗血小板藥品...等)，請依照醫師指示，進行停藥準備。

說明醫師：

(簽章) 時間:西元

年

月

日

時

分

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
中耳抽水並通氣管置入說明書

病歷號：_____

姓名：_____

生日：民國_____

床號：_____

本人(或家屬) _____已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

與病人之關係：

其他：

病人(或家屬)： (簽章) 時間:西元 年 月 日 時 分

見證人(如無見證人得免填載)：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

見證人部分，如無見證人得免填載