

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院  
胸腔鏡交感神經切除手術說明書

病歷號：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

生日：民國\_\_\_\_\_

床號：\_\_\_\_\_

這份說明書是有關您即將接受的手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術(或醫療處置)有任何疑問，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

**手術內容：**

- 1.手術於全身麻醉下進行。
- 2.在胸廓兩側大約乳頭連線的位置〈約第四肋間〉，切開約一公分長的傷口。
- 3.將胸腔鏡戳入胸腔內，在短暫的停止呼吸與肺葉塌陷之下，經由胸腔鏡直視交感神經節並加以電燒灼〈通常是第二胸神經節，腋下多汗會加燒第三神經節〉，以手溫監測方式立刻得知燒灼效果〈一般術後約可上升攝氏一度以上〉。
- 4.最後恢復呼吸使肺葉恢復通氣，傷口縫合一到兩針。
- 5.術後會有短暫的胸悶情形，必須服用止痛藥且練習深呼吸。
- 6.回病房休養並追蹤術後胸部 X 光，第二天即可出院。

**手術效益：**解除多汗現象所造成的日常生活困擾。

**手術風險：**

- 1.血胸、氣胸：量多時必須插胸管治療。
- 2.第一胸神經節受損導致眼瞼下垂或霍納氏症候群。
- 3.臂神經叢受損。
- 4.代償性多汗：背部、臀部、大腿。
- 5.其他：傷口感染、肺炎等，視病患身體健康狀況而有所不同。

**可能替代方案：**

- 1.生活調適、皮膚科或整形外科治療。
- 2.亦可詢問其他醫師之意見。

**檢查前停／用藥指示（未依指示停／用藥，可能造成無法執行檢查）：**

- 1.若有在服用影響凝血功能之保健食品或中草藥，建議至少停用七天。如：魚油、大蒜精、銀杏、豆激酶、維生素 E、輔酶 Q10、葡萄糖胺、月見草油、亞麻籽油、人參、丹參、紅花、桃仁、菝葜、川七、沒藥、乳香、薑黃素等。
- 2.其他需停用藥品(如:抗凝血、抗血小板藥品...等)，請依照醫師指示，進行停藥準備。

**說明醫師：**

-----  
本人(或家屬)已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

與病人之關係：

其他：

病人(或家屬)：

見證人(如無見證人得免填載)：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。  
見證人部分，如無見證人得免填載。